



Schildklierandoeningen bij hond en kat

Marieke van der Kooij
Dierenarts Specialist Interne Geneeskunde,
Diplomate ECVIM

Diergeneeskundig specialistisch centrum de Wagenrenk, The Netherlands
Mvanderkooij01@yahoo.com

De schildklier bestaat uit 2 lobben die met elkaar verbonden zijn en aan weerszijden van de luchtpijp liggen. Schildklier hormoon heeft vele functies. Onder andere is het belangrijk voor groei en ontwikkeling en de productie van bijvoorbeeld cholesterol en rode bloedcellen. Ook stimuleert het het basale metabolisme.

Hypothyreoidie is de meest voorkomende ziekte van endocriene organen bij de hond. Het stellen van de diagnose kan soms lastig zijn want alleen een laag T4 kan ook vele andere oorzaken hebben.

Hyperthyreoidie komt vaak voor bij oudere katten die vermageren ondanks goede eetlust. Het kan definitief behandeld worden met radioactief jodium of een operatie. Medicamenteuze behandeling of een jodiumarm dieet zijn reversibele behandel opties.

Hyperthyreoidie bij de hond is veel zeldzamer. Het kan veroorzaakt worden door een (vaak kwaadaardige) schildkliertumor, maar wordt ook weleens gezien bij honden die op een rauw vlees dieet staan als daar schildklier in verwerkt is.